DESINFEKTIONSPLAN
für Kindereinrichtungen

Dr. Schumacher

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Haut & Hände Desinfektion	**Hygienische Händedesinfektion**	Vor dem Anlegen von Pflastern und Verbänden o. ä. Nach jedem Wickeln. Nach Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem. Bei erhöhter Infektionsgefahr mehrmals täglich.	☐ **ASEPTOMAN®** ☐ **ASEPTOMAN® MED**	Konz. - 30 Sek.	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel bis zur vollständigen Auftrocknung gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeiter
Haut & Hände Pflege	**Händewaschung**	Vor Arbeitsbeginn. Nach Arbeitsende. Vor dem Kontakt mit Lebensmitteln. Nach dem Kontakt mit Tieren. Nach der Toilettenbenutzung. Vor dem Umgang mit Lebensmitteln. Wenn die Hände sichtbar verschmutzt oder klebrig sind. Bei Bedarf.	☐ **DESCOSOFT SENSITIVE** ☐ **DESCOSOFT**		Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmem Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Dabei besonders die Fingerzwischenräume beachten.	Alle Mitarbeiter
	Hautpflege	Bei Bedarf.	☐ **BIALIND**		Hautpflegecreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeiter
	Hautschutz	Bei Bedarf.	☐ **DESOLIND PROTECT**		Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeiter
Fläche	**Fieberthermometer**	Nach Gebrauch.	☐ **DESCOSEPT PUR** ☐ **DESCOSEPT SENSITIVE WIPES**	Konz. - 1 Min. Konz. - 1 Min.	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch vollständig abwischen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Spielzeug	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material, z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenes.	☐ **DESCOSEPT PUR** ☐ **DESCOSEPT SENSITIVE WIPES** ☐ **BIGUANID FLÄCHE N** ☐ **OPTISAL PLUS**	Konz. - 1 Min. Konz. - 1 Min. 0,5 % - 30 Min. 0,5 % - 60 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Alle Mitarbeiter
	Bällebad	Siehe http://www.ihph.de/vah-online/uploads/PDF/VAH_Baellebad_HM_1-2_17.pdf				
	Wickeltischauflage	Nach Gebrauch.	☐ **DESCOSEPT PUR** ☐ **DESCOSEPT SENSITIVE WIPES**	Konz. - 1 Min. Konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Arbeitsflächen, Inventar, Wickeltisch	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material, z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenes.	☐ **DESCOSEPT PUR** ☐ **DESCOSEPT SENSITIVE WIPES** ☐ **BIGUANID FLÄCHE N** ☐ **OPTISAL PLUS**	Konz. - 1 Min. Konz. - 1 Min 0,5 % - 30 Min. 0,5 % - 60 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Fußböden	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material, z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenes.	☐ **BIGUANID FLÄCHE N** ☐ **OPTISAL PLUS**	0,5 % - 30 Min. 0,5 % - 60 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Toilette, Waschbecken	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material, z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenes.	☐ **DESCOSEPT PUR** ☐ **DESCOSEPT SENSITIVE WIPES**	Konz. - 1 Min. Konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
Sonstiges	**Arbeitskleidung**	Sofortiger Wechsel nach Kontamination.			Desinfizierendes Waschverfahren	Alle Mitarbeiter
	Schutzkleidung: **Flüssigkeitsdichte, ungepuderte, allergenarme und zusätzlich reinigungs- und desinfektionsmittelbeständige Schutzhandschuhe (DIN EN 420 und DIN EN 374) mit verlängertem Schaft zum Stulpen.**	Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten.			Einmalhandschuhe nach Gebrauch entsorgen.	Alle Mitarbeiter
	Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch (DIN EN 455 Teil 1-4)	Beim Umgang mit Ausscheidungen, Blut, Erbrochenem. Bei Bedarf.			Nach Gebrauch entsorgen.	

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im **ECO WIPES** Spendersystem eingesetzt werden.
Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Instituts (§18 IfSG) anzuwenden (Hände: **ASEPTOMAN® VIRAL**, Flächen: **ULTRASOL® ACTIVE**).
Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Datum/erstellt, geprüft und freigegeben

Dr. Schumacher GmbH · Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · F +49 5664 8444 · info@schumacher-online.com · **www.schumacher-online.com**

02/2018